

使用说明

一、2015年版《药品手册》收载我院现用药品品种，新增“急救药品目录”和“高危药品目录”。

二、本手册中的西药按主要药理作用分类，每个类别下药品以首字汉语拼音字母为序。中成药、急救药品、高危药品、职工药品均以首字汉语拼音字母为序。药品信息包括中文通用名、英文通用名、商品名、规格、参考价、医保类别、精神药品类别、每日最大剂量、使用部门、贮存条件。

三、根据药品说明书给出药品的“每日最大剂量”，以供医生开具处方参考。医保报销类别中的“甲”为无自负；“乙”为自负10%；“丙”为全自负。药品贮存条件：阴凉处，温度不高于20℃；常温处，温度0-30℃；冷处，2-10℃；贮存相对湿度45%-75%。

四、“精一”表示第一类精神药品，“精二”表示第二类精神药品。标有“△”符号为国家基本药物，根据《国家基本药物目录》2012年版制定。高危药品目录参考ISMP（美国医疗安全协会）2012年版制定，A级是高危药品管理的最高级别，使用频率高，一旦用药错误，患者死亡风险最高。

五、《药品手册》信息截至到2015年2月9日，药品价格、医保报销类别随时可能会有调整，仅供参考。由于药品生产、流通、使用等原因，目录中个别品种可能出现短缺或调整。

六、《药品手册》的修订，虽力求准确无误，然疏误遗漏在所难免。请各科室随时提出宝贵意见，供再版时参考。

联系人：熊玉兰

电话：82801971,82801922

处方管理办法

第一章 总则

第一条 为规范处方管理,提高处方质量,促进合理用药,保障医疗安全,根据《执业医师法》、《药品管理法》、《医疗机构管理条例》、《麻醉药品和精神药品管理条例》等有关法律、法规,制定本办法。

第二条 本办法所称处方,是指由注册的执业医师和执业助理医师(以下简称医师)在诊疗活动中为患者开具的、由取得药学专业技术职务任职资格的药学专业技术人员(以下简称药师)审核、调配、核对,并作为患者用药凭证的医疗文书。处方包括医疗机构病区用药医嘱单。

本办法适用于与处方开具、调剂、保管相关的医疗机构及其人员。

第三条 卫生部负责全国处方开具、调剂、保管相关工作的监督管理。

县级以上地方卫生行政部门负责本行政区域内处方开具、调剂、保管相关工作的监督管理。

第四条 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循安全、有效、经济的原则。

处方药应当凭医师处方销售、调剂和使用。

第二章 处方管理的一般规定

第五条 处方标准(附件1)由卫生部统一规定,处方格式由省、自治区、直辖市卫生行政部门(以下简称省级卫生行政部门)统一制定,处方由医疗机构按照规定的标准和格式印制。

第六条 处方书写应当符合下列规则:

- (一) 患者一般情况、临床诊断填写清晰、完整,并与病历记载相一致。
- (二) 每张处方限于一名患者的用药。

(三) 字迹清楚，不得涂改；如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期。

(四) 药品名称应当使用规范的中文名称书写，没有中文名称的可以使用规范的英文名称书写；医疗机构或者医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用代号；书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范，药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写，但不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句。

(五) 患者年龄应当填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重。

(六) 西药和中成药可以分别开具处方，也可以开具一张处方，中药饮片应当单独开具处方。

(七) 开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过 5 种药品。

(八) 中药饮片处方的书写，一般应当按照“君、臣、佐、使”的顺序排列；调剂、煎煮的特殊要求注明在药品右上方，并加括号，如布包、先煎、后下等；对饮片的产地、炮制有特殊要求的，应当在药品名称之前写明。

(九) 药品用法用量应当按照药品说明书规定的常规用法用量使用，特殊情况需要超剂量使用时，应当注明原因并再次签名。

(十) 除特殊情况外，应当注明临床诊断。

(十一) 开具处方后的空白处划一斜线以示处方完毕。

(十二) 处方医师的签名式样和专用签章应当与院内药学部门留样备查的式样相一致，不得任意改动，否则应当重新登记留样备案。

第七条 药品剂量与数量用阿拉伯数字书写。剂量应当使用法定剂量单位：重量以克 (g)、

毫克 (mg)、微克 (μ g)、纳克 (ng) 为单位；容量以升 (L)、毫升 (ml) 为单位；国际单位 (IU)、单位(U)；中药饮片以克 (g) 为单位。

片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂分别以片、丸、粒、袋为单位；溶液剂以支、瓶为单位；软膏及乳膏剂以支、盒为单位；注射剂以支、瓶为单位，应当注明含量；中药饮片以剂为单位。

第三章 处方权的获得

第八条 经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权。

经注册的执业助理医师在医疗机构开具的处方，应当经所在执业地点执业医师签名或加盖专用签章后方有效。

第九条 经注册的执业助理医师在乡、民族乡、镇、村的医疗机构独立从事一般的执业活动，可以在注册的执业地点取得相应的处方权。

第十条 医师应当在注册的医疗机构签名留样或者专用签章备案后，方可开具处方。

第十一条 医疗机构应当按照有关规定对本机构执业医师和药师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训。执业医师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权，药师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格。

医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后，方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方，但不得为自己开具该类药品处方。药师取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格后，方可在本机构调剂麻醉药品和第一类精神药品。

第十二条 试用期人员开具处方，应当经所在医疗机构有处方权的执业医师审核、并签名或加

盖专用签章后方有效。

第十三条 进修医师由接收进修的医疗机构对其胜任本专业工作的实际情况进行认定后授予相应的处方权。

第四章 处方的开具

第十四条 医师应当根据医疗、预防、保健需要，按照诊疗规范、药品说明书中的药品适应证、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开具处方。

开具医疗用毒性药品、放射性药品的处方应当严格遵守有关法律、法规和规章的规定。

第十五条 医疗机构应当根据本机构性质、功能、任务，制定药品处方集。

第十六条 医疗机构应当按照经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称购进药品。同一通用名称药品的品种，注射剂型和口服剂型各不得超过 2 种，处方组成类同的复方制剂 1~2 种。因特殊诊疗需要使用其他剂型和剂量规格药品的情况除外。

第十七条 医师开具处方应当使用经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称。

医师开具院内制剂处方时应当使用经省级卫生行政部门审核、药品监督管理部门批准的名称。

医师可以使用由卫生部公布的药品习惯名称开具处方。

第十八条 处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不得超过 3 天。

第十九条 处方一般不得超过 7 日用量；急诊处方一般不得超过 3 日用量；对于某些慢性病、

老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由。

医疗用毒性药品、放射性药品的处方用量应当严格按照国家有关规定执行。

第二十条 医师应当按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则，开具麻醉药品、第一类精神药品处方。

第二十一条 门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，首诊医师应当亲自诊查患者，建立相应的病历，要求其签署《知情同意书》。

病历中应当留存下列材料复印件：

- (一) 二级以上医院开具的诊断证明；
- (二) 患者户籍簿、身份证或者其他相关有效身份证明文件；
- (三) 为患者代办人员身份证明文件。

第二十二条 除需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者外，麻醉药品注射剂仅限于医疗机构内使用。

第二十三条 为门(急)诊患者开具的麻醉药品注射剂，每张处方为一次常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过7日常用量；其他剂型，每张处方不得超过3日常用量。

第一类精神药品注射剂，每张处方为一次常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过7日常用量；其他剂型，每张处方不得超过3日常用量。哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方不得超过15日常用量。

第二类精神药品一般每张处方不得超过7日常用量；对于慢性病或某些特殊情况的患者，处

方用量可以适当延长，医师应当注明理由。

第二十四条 为门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品注射剂，每张处方不得超过3日常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过15日常用量；其他剂型，每张处方不得超过7日常用量。

第二十五条 为住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应当逐日开具，每张处方为1日常用量。

第二十六条 对于需要特别加强管制的麻醉药品，盐酸二氢埃托啡处方为一次常用量，仅限于二级以上医院内使用；盐酸哌替啶处方为一次常用量，仅限于医疗机构内使用。

第二十七条 医疗机构应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门(急)诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者，每3个月复诊或者随诊一次。

第二十八条 医师利用计算机开具、传递普通处方时，应当同时打印出纸质处方，其格式与手写处方一致；打印的纸质处方经签名或者加盖签章后有效。药师核发药品时，应当核对打印的纸质处方，无误后发给药品，并将打印的纸质处方与计算机传递处方同时收存备查。

第五章 处方的调剂

第二十九条 取得药学专业技术职务任职资格的人员方可从事处方调剂工作。

第三十条 药师在执业的医疗机构取得处方调剂资格。药师签名或者专用签章式样应当在本机构留样备查。

第三十一条 具有药师以上专业技术职务任职资格的人员负责处方审核、评估、核对、发药以

及安全用药指导；药士从事处方调配工作。

第三十二条 药师应当凭医师处方调剂处方药品，非经医师处方不得调剂。

第三十三条 药师应当按照操作规程调剂处方药品：认真审核处方，准确调配药品，正确书写药袋或粘贴标签，注明患者姓名和药品名称、用法、用量，包装；向患者交付药品时，按照药品说明书或者处方用法，进行用药交待与指导，包括每种药品的用法、用量、注意事项等。

第三十四条 药师应当认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性。

第三十五条 药师应当对处方用药适宜性进行审核，审核内容包括：

- (一) 规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定；
- (二) 处方用药与临床诊断的相符性；
- (三) 剂量、用法的正确性；
- (四) 选用剂型与给药途径的合理性；
- (五) 是否有重复给药现象；
- (六) 是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌；
- (七) 其它用药不适宜情况。

第三十六条 药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。

药师发现严重不合理用药或者用药错误，应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，

按照有关规定报告。

第三十七条 药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。

第三十八条 药师在完成处方调剂后，应当在处方上签名或者加盖专用签章。

第三十九条 药师应当对麻醉药品和第一类精神药品处方，按年月日逐日编制顺序号。

第四十条 药师对于不规范处方或者不能判定其合法性的处方，不得调剂。

第四十一条 医疗机构应当将本机构基本用药供应目录内同类药品相关信息告知患者。

第四十二条 除麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和儿科处方外，医疗机构不得限制门诊就诊人员持处方到药品零售企业购药。

第六章 监督管理

第四十三条 医疗机构应当加强对本机构处方开具、调剂和保管的管理。

第四十四条 医疗机构应当建立处方点评制度，填写处方评价表（附件2），对处方实施动态监测及超常预警，登记并通报不合理处方，对不合理用药及时予以干预。

第四十五条 医疗机构应当对出现超常处方3次以上且无正当理由的医师提出警告，限制其处方权；限制处方权后，仍连续2次以上出现超常处方且无正当理由的，取消其处方权。

第四十六条 医师出现下列情形之一的，处方权由其所在医疗机构予以取消：

- （一）被责令暂停执业；
- （二）考核不合格离岗培训期间；

- (三) 被注销、吊销执业证书；
- (四) 不按照规定开具处方，造成严重后果的；
- (五) 不按照规定使用药品，造成严重后果的；
- (六) 因开具处方牟取私利。

第四十七条 未取得处方权的人员及被取消处方权的医师不得开具处方。未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的医师不得开具麻醉药品和第一类精神药品处方。

第四十八条 除治疗需要外，医师不得开具麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品处方。

第四十九条 未取得药学专业技术职务任职资格的人员不得从事处方调剂工作。

第五十条 处方由调剂处方药品的医疗机构妥善保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为 1 年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为 2 年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为 3 年。

处方保存期满后，经医疗机构主要负责人批准、登记备案，方可销毁。

第五十一条 医疗机构应当根据麻醉药品和精神药品处方开具情况，按照麻醉药品和精神药品品种、规格对其消耗量进行专册登记，登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量。专册保存期限为 3 年。

第五十二条 县级以上地方卫生行政部门应当定期对本行政区域内医疗机构处方管理情况进行监督检查。

县级以上卫生行政部门在对医疗机构实施监督管理过程中，发现医师出现本办法第四十六条规定情形的，应当责令医疗机构取消医师处方权。

第五十三条 卫生行政部门的工作人员依法对医疗机构处方管理情况进行监督检查时，应当出示证件；被检查的医疗机构应当予以配合，如实反映情况，提供必要的资料，不得拒绝、阻碍、隐瞒。

第七章 法律责任

第五十四条 医疗机构有下列情形之一的，由县级以上卫生行政部门按照《医疗机构管理条例》第四十八条的规定，责令限期改正，并可处以 5000 元以下的罚款；情节严重的，吊销其《医疗机构执业许可证》：

（一）使用未取得处方权的人员、被取消处方权的医师开具处方的；

（二）使用未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的医师开具麻醉药品和第一类精神药品处方的；

（三）使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作的。

第五十五条 医疗机构未按照规定保管麻醉药品和精神药品处方，或者未依照规定进行专册登记的，按照《麻醉药品和精神药品管理条例》第七十二条的规定，由设区的市级卫生行政部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，吊销其印鉴卡；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级、撤职、开除的处分。

第五十六条 医师和药师出现下列情形之一的，由县级以上卫生行政部门按照《麻醉药品和

精神药品管理条例》第七十三条的规定予以处罚：

（一）未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的医师擅自开具麻醉药品和第一类精神药品处方的；

（二）具有麻醉药品和第一类精神药品处方医师未按照规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方，或者未按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则使用麻醉药品和第一类精神药品的；

（三）药师未按照规定调剂麻醉药品、精神药品处方的。

第五十七条 医师出现下列情形之一的，按照《执业医师法》第三十七条的规定，由县级以上卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动；情节严重的，吊销其执业证书。

（一）未取得处方权或者被取消处方权后开具药品处方的；

（二）未按照本办法规定开具药品处方的；

（三）违反本办法其他规定的。

第五十八条 药师未按照规定调剂处方药品，情节严重的，由县级以上卫生行政部门责令改正、通报批评，给予警告；并由所在医疗机构或者其上级单位给予纪律处分。

第五十九条 县级以上地方卫生行政部门未按照本办法规定履行监管职责的，由上级卫生行政部门责令改正。

第八章 附则

第六十条 乡村医生按照《乡村医生从业管理条例》的规定，在省级卫生行政部门制定的乡村医生基本用药目录范围内开具药品处方。

第六十一条 本办法所称药学专业技术人员，是指按照卫生部《卫生技术人员职务试行条例》规定，取得药学专业技术职务任职资格人员，包括主任药师、副主任药师、主管药师、药师、药士。

第六十二条 本办法所称医疗机构，是指按照《医疗机构管理条例》批准登记的从事疾病诊断、治疗活动的医院、社区卫生服务中心（站）、妇幼保健院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生室（所）、急救中心（站）、专科疾病防治院（所、站）以及护理院（站）等医疗机构。

第六十三条 本办法自 2007 年 5 月 1 日起施行。《处方管理办法（试行）》（卫医发[2004]269 号）和《麻醉药品、精神药品处方管理规定》（卫医法[2005]436 号）同时废止。

北京大学第六医院药品不良反应上报说明

一、各科主任指定专人负责本科室药物不良反应事件上报工作，负责药品的不良反应报告和监测工作。

二、各科室发现药品不良反应，及时填写《药品不良反应/事件报告表》，可由副班护士交至病房药房，也可电话让药剂科来取报表。药品厂家和批号可空出，由药剂科人员补充填写。

三、新的、严重的药品不良反应应当在发现或者获知之日起 15 日内报告，死亡病例须立即报告；其他药品不良反应应当在发现或者获知之日起 30 日内报告；有随访信息的应当及时报告。重点监测新的、严重的药品不良反应。发生严重药品不良反应/药品群体不良事件后应当积极救治患者，医疗记录完备，留存相关药品、物品的留样，及时通知药剂科和相关科室，迅速开展临床调查。

四、 国产药品在新药监测期内应当报告该药品的所有不良反应；进口药品自首次获准进口之日起 5 年内，报告该进口药品发生的所有不良反应。其他药品报告新的和严重的不良反应。

五、《药品不良反应/事件报告表》的填报内容应真实、完整、准确。药剂科定期将《药品不良反应/事件报告表》送至各科室，以方便取用。门诊医生请到各层分诊台取用《药品不良反应/事件报告表》。

六、医院鼓励医务人员主动报告药品不良反应，根据填写报表的数量和质量，每季度给予奖励。

联系人：熊玉兰 赵悦 电话 82801971

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 1 抗精神病药..... | 1 |
| 2 抗精神病药长效剂..... | 5 |
| 3 抗抑郁药..... | 7 |
| 4 抗焦虑药、镇静催眠药..... | 11 |
| 5 心境稳定剂..... | 13 |
| 6 中枢兴奋药..... | 14 |
| 7 其它神经系统用药..... | 14 |
| 8 脑代谢功能改善、抗痴呆药..... | 15 |
| 9 抗震颤麻痹药..... | 17 |
| 10 抗胆碱药..... | 17 |
| 11 麻醉用药..... | 17 |
| 12 抗菌药..... | 18 |
| 13 心血管系统用药..... | 19 |

| | |
|------------------------|----|
| 14 呼吸系统用药 | 20 |
| 15 消化系统用药 | 21 |
| 16 血液系统药物 | 22 |
| 17 降血糖药 | 23 |
| 18 抗变态反应药 | 23 |
| 19 解热镇痛药 | 24 |
| 20 营养药 | 24 |
| 21 维生素、矿物质类药 | 25 |
| 22 调节水、电解质及酸碱平衡药 | 26 |
| 23 中成药 | 27 |
| 24 急救药 | 30 |
| 25 高危药品 | 34 |
| 26 职工药品 | 37 |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别/ 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
|--------------|--------------|-----|--------------|------------|---------------|--------|---------------|-----------------|
| 抗精神病药 | | | | | | | | |
| 阿立哌唑口腔崩解片 Δ | Aripiprazole | 博思清 | 5mg×20/盒 | 60.29 | 乙, 限不配合服药患者 | 30mg | 门诊 / 病房 | 密闭保存 |
| 阿立哌唑片 Δ | | 安律凡 | 5mg×10/盒 | 105.99 | 乙 | 30mg | 门诊 | 遮光, 密闭保存 |
| | | | 10mg×10/盒 | 179.97 | 乙 | 30mg | 门诊 / 病房 | 遮光, 密闭保存 |
| | | 奥派 | 10mg×14/盒 | 61.20 | 乙 | 30mg | 门诊 / 病房 | 密闭, 干燥保存 |
| 氨磺必利片 | Amisulpride | 帕可 | 0.2g×20/盒 | 198.70 | 丙 | 1200mg | 门诊 | 避光, 密封保存 |
| | | 索里昂 | 0.2g×20/盒 | 322.00 | 乙 | 1200mg | 门诊 / 病房 | 低于 30℃下 室温保存 |
| 奥氮平口腔 | Olanzapine | 再普乐 | 5mg×7/盒 | 291.00 | 丙 | 20mg | 门诊 | 避光, |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 崩解片 | | | | | | | | 15-30℃密封保存 |
| 奥氮平片 | | 悉敏 | 5mg×28/盒 | 300.00 | 乙 | 20mg | 门诊 / 病房 | 遮光、密封、阴凉处不超过20℃,干燥处保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别/ 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 奥氮平片 | Olanzapine | 再普乐 | 5mg×28/盒 | 685.39 | 乙 | 20mg | 门诊 / 病房 | 15-30℃密封保存 |
| | | | 10mg×7/盒 | 324.00 | 乙 | 20mg | 门诊 | 15-30℃密封保存 |
| 奋乃静片Δ | Perphenazine | | 2mg×100/瓶 | 4.02 | 甲 | 60mg | 门诊 / 病房 | 遮光,密封保存 |
| 氟哌啶醇片 Δ | Haloperidol | | 2mg×100/瓶 | 9.20 | 甲 | 40mg | 门诊 / 病房 | 遮光,密封保存 |
| 氟哌啶醇 注射液Δ | | | 5mg:1ml/支 | 2.99 | 甲 | 30mg | 门诊 / | 遮光,密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 病房 | |
| 喹硫平片 | Quetiapine | 启维 | 200mg×16/ 盒 | 57.90 | 甲 | 750mg | 门诊 | 密闭保存 |
| | | 启维Δ | 25mg×28/盒 | 18.80 | 甲 | 750mg | 门诊 | 密闭保存 |
| | | 舒思Δ | 100mg×30/ 瓶 | 62.40 | 甲 | 750mg | 门诊 / 病房 | 密闭保存 |
| | | 思瑞康 | 200mg×20/ 盒 | 250.00 | 甲 | 800mg | 门诊 / 病房 | 30℃以下密 闭保存 |
| | | 思瑞康 Δ | 25mg×20/盒 | 100.97 | 甲 | 800mg | 门诊 / 病房 | 30℃以下密 闭保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别/ 精神药品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 利培酮 口服液 | Risperidone | 单克 | 30mg:30ml/ 瓶 | 58.14 | 甲 | 16mg | 门诊 | 避光, 密闭 保存 |
| | | 维思通 | 30mg:30ml/ 瓶 | 166.00 | 甲 | 16mg | 门诊 / 病房 | 15-30℃, 勿 冷冻 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 利培酮口腔崩解片 | | 醒志 | 1mg×20/盒 | 40.25 | 乙, 限不配合服药患者 | 16mg | 门诊 | 密闭, 在干燥处保存, 不超过 20℃ |
| 利培酮片Δ | | 单克 | 2mg×20/盒 | 45.51 | 甲 | 10mg | 门诊 | 遮光, 密闭保存 |
| | | 索乐 | 1mg×30/盒 | 48.20 | 甲 | 16mg | 门诊 | 遮光, 密闭保存 |
| | | 维思通 | 1mg×20/盒 | 60.95 | 甲 | 10mg | 门诊 | 15-30℃密封保存 |
| | | | 2mg×20/盒 | 110.99 | 甲 | 10mg | 门诊 / 病房 | 15-30℃密封保存 |
| 硫必利片 | Tiapride | | 100mg×100/瓶 | 16.64 | 甲, 限儿童 | 600mg | 门诊 / 病房 | 遮光, 密封保存 |
| 硫利达嗪片 | Thioridazine | 利达新 | 25mg×100/瓶 | 22.60 | 甲 | 800mg | 门诊 / 病房 | 30℃以下保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|----------------|--------|---|-------|-----------|--------------------------------|
| 氯丙嗪片△ | Chlorpromazine | | 25mg×100/ 瓶 | 4.79 | 甲 | 600mg | 门诊 /病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 氯氮平片△ | Clozapine | | 25mg×100/ 瓶 | 5.39 | 甲 | 600mg | 门诊 /病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 帕利哌酮 缓释片 | Paliperidone | 芮达 | 3mg×7/盒 | 183.00 | 乙 | 12mg | 门诊 /病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| | | | 6mg×7/盒 | 311.00 | 乙 | 12mg | 门诊 /病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 齐拉西酮 胶囊 | Ziprasidone | 思贝 格 | 20mg×20/ 盒 | 62.20 | 乙 | 160mg | 门诊 /病房 | 密封, 阴 凉, 20℃以 下干燥处 保存 |
| | | 卓乐 定 | 20mg×10/ 盒 | 95.40 | 乙 | 160mg | 门诊 /病房 | 30℃以下 室温保存 |
| | | | 40mg×10/ | 162.00 | 乙 | 160mg | 门诊 | 30℃以下 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| | | | 盒 | | | | | 室温保存 |
| | | | 60mg×10/ 盒 | 221.00 | 乙 | 160mg | 门诊 | 30℃以下 室温保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 注射用甲磺酸齐拉西酮 | Ziprasidone | 卓乐定 | 30mg×1 支/ 盒 | 271.00 | 丙 | 40mg | 门诊 /病房 | 15-30℃避 光保存 |
| 舒必利片Δ | Sulpiride | | 0.1g×100/瓶 | 5.17 | 甲 | 1.2g | 门诊 /病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 抗精神病药长效剂 | | | | | | | | |
| 癸氟奋乃静注射液Δ | Fluphenazine Decanoate | 滴加 | 25mg:1ml/支 | 6.50 | 乙 | 25mg/ 2-5 周 | 门诊/ 病房 | 遮光, 密 闭, 凉暗处 不超过 20℃ |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | | 6.50 | 乙 | 75mg/ 2-4周 | 门诊 | 遮光，密闭，凉暗处保存，避光不超过20℃ |
| 癸酸氟哌啶醇注射液 | Haloperidol Decanoate | 哈力多 | 50mg:1ml/支 | 22.19 | 甲 | 300mg/ 4周 | 门诊/病房 | 室温 25℃ 以下，不需冷藏、冷冻 |
| 五氟利多片 △ | Penfluridol | | 20mg×24/瓶 | 14.14 | 甲 | 120mg/ 周 | 门诊/病房 | 密封保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别/ 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 注射用利培酮微球 | Risperidone | 恒德 | 25mg×1支/ 盒 | 850.00 | 乙，限不配合服药患者 | 50mg/ 2周 | 门诊/病房 | 2-8℃保存 |
| | | | 37.5mg×1支/ 盒 | 1159.00 | 乙，限不配合服药患者 | 50mg/ 2周 | 门诊/病房 | 2-8℃保存 |
| 棕榈哌泊塞嗪注射液 | Pipotiazine Palmitate | 尼蒙舒 | 50mg:2ml/支 | 39.80 | 甲 | 200mg/ 4周 | 门诊/病房 | 避光，室温保存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | 房 | |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | Paliperidone Palmitate | 善思达 | 75mg×1支/盒 | 1575.00 | 丙 | 150mg/月 | 门诊 | 30℃以下常温保存, 勿冷冻 |
| | | | 100mg×1支/盒 | 1963.00 | 丙 | 150mg/月 | 门诊 | 30℃以下常温保存, 勿冷冻 |
| | | | 150mg×1支/盒 | 2678.00 | 丙 | 150mg/月 | 门诊 | 30℃以下常温保存, 勿冷冻 |
| | | | | | | | | |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别/ 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 抗抑郁药 | | | | | | | | |
| 阿戈美拉汀片 | Agomelatine | 维度新 | 25mg×14/盒 | 278.60 | 丙 | 50mg | 门诊 | 密封保存 |
| 阿米替林片 Δ | Amitriptyline | | 25mg×100/瓶 | 16.90 | 甲 | 300mg | 门诊/病房 | 遮光, 密封保存 |
| 艾司西酞 | Escitalopram | 百适可 | 5mg×14/盒 | 74.40 | 乙 | 20mg | 门诊 | 密封保存 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|------------|--------|---|----------------------|-------|------------------|
| 普兰片 | | | | | | | /病房 | |
| | | 来士普 | 10mg×7/盒 | 117.00 | 乙 | 20mg | 门诊/病房 | 30℃以下保存 |
| 安非他酮缓释片 | Bupropion | | 0.15g×12/盒 | 87.86 | 乙 | 400mg | 门诊 | 遮光, 密封保存 |
| 安非他酮片 | | 乐孚亨 | 75mg×14/盒 | 59.93 | 乙 | 450mg | 门诊 | 10℃-30℃, 密封、干燥保存 |
| 度洛西汀肠溶胶囊 | Dulo×etine | 欣百达 | 30mg×7/盒 | 81.40 | 丙 | 60mg (GAD: 120mg) | 门诊 | 15-30℃, 室温保存 |
| | | | 60mg×14/盒 | 270.00 | 乙 | 60mg (GAD: 120mg) | 门诊/病房 | 15-30℃, 室温保存 |

GAD: 广泛性焦虑障碍

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别/ 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
|---------|------------|-----|--------------|------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 度洛西汀肠溶片 | Dulo×etine | 奥思平 | 20mg×20/盒 | 94.80 | 乙 | 60mg | 门诊/病房 | 密封置阴凉处, 不超过 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|-----------|--------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | | | | | | 房 | 20℃ |
| 氟伏沙明片 | Fluvo× amine | 兰释 | 50mg×30/盒 | 108.00 | 乙 | 300mg | 门诊/病房 | 25℃以下密封, 遮光保存 |
| 氟西汀分散片 | Fluo× etine | 百优解 | 20mg×28/盒 | 298.00 | 甲 | 80mg | 门诊/病房 | 15℃-20℃ 室温保存 |
| 氟西汀胶囊 | | 优克 | 20mg×7/盒 | 25.30 | 甲 | 40mg | 门诊 | 遮光、密封、阴凉处不超过20℃干燥保存 |
| 氟西汀片 | | 开克 | 10mg×14/盒 | 29.00 | 甲 | 40mg | 门诊 | 遮光密封保存 |
| 甲磺酸瑞波西汀胶囊 | Rebo× etine | 叶洛抒 | 4mg×14/盒 | 57.80 | 自付 10 | 12mg | 门诊 | 密闭, 室温保存 |
| 氯米帕明片 △ | Clomipramine | | 25mg×50/瓶 | 19.29 | 甲 | 250mg | 门诊/病房 | 遮光, 密封保存 |
| 马普替林片 | Maprotiline | | 25mg×48/盒 | 24.95 | 甲 | 225mg | 门诊/病房 | 密封保存 |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
|---------------|-------------|-----|-----------------|------------|---------------|--------|-----------|----------------------|
| 米氮平口腔 崩解片 | Mirtazapine | 瑞美隆 | 15mg×18/盒 | 172.80 | 丙 | 45mg | 门诊 | 30℃以下避 光,干燥保 存 |
| 米氮平片 | | 康多宁 | 15mg×20/盒 | 89.34 | 乙 | 45mg | 门诊 | 密封保存 |
| | | 瑞美隆 | 30mg×10/盒 | 128.00 | 乙 | 45mg | 门诊 /病房 | 30℃以下避 光干燥 |
| 帕罗西汀肠 溶缓释片 | Paroxetine | 赛乐特 | 12.5mg×10/ 盒 | 89.40 | 丙 | 62.5mg | 门诊 | 25℃以下 保存 |
| | | | 25mg×10/盒 | 152.00 | 丙 | 62.5mg | 门诊 | 25℃以下 保存 |
| 帕罗西汀片 △ | | 乐友 | 20mg×14/盒 | 59.91 | 甲 | 60mg | 门诊 | 遮光密闭 保存 |
| | | 赛乐特 | 20mg×10/盒 | 105.57 | 甲 | 60mg | 门诊 /病房 | 遮光,密闭, |
| 曲唑酮片 | Trazodone | 每素玉 | 50mg×20/盒 | 64.80 | 甲 | 200mg | 门诊 | 遮光,密闭 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | 保存 |
| | | 美时玉 | 50mg×20/盒 | 64.40 | 甲 | 200mg | 门诊/病房 | 避光, 密闭, 40℃以下保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 舍曲林片 | Sertraline | 乐元 | 50mg×14/盒 | 53.82 | 甲 | 200mg | 门诊 | 干燥处保存 |
| | | 左洛复 | 50mg×14/盒 | 94.00 | 甲 | 200mg | 门诊/病房 | 30℃以下密封保存 |
| 圣·约翰草提取物片 | E×tract of St.John's Wort | 路优泰 | 300mg×15/盒 | 47.55 | 丙 | 900mg | 门诊 | 干燥处保存 |
| 文拉法辛缓释胶囊 | Venlafa×ine | 怡诺思 | 75mg×14/盒 | 131.96 | 甲 | 225mg | 门诊/病房 | 25℃以下室温、干燥处保存 |
| | | | 150mg×14/盒 | 179.03 | 甲 | 225mg | 门诊 | 25℃以下室温、干燥处保存 |
| 文拉法辛缓释片 | | 博乐欣 | 75mg×14/盒 | 121.00 | 甲 | 225mg | 门诊 | 密封保存 |

| 文拉法辛 胶囊 | | | 25mg×16/盒 | 37.26 | 甲 | 350mg | 门诊/ 病房 | 密封保存 |
|-------------------|------------|-----|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 西酞普兰片 | Citalopram | 喜普妙 | 20mg×14/盒 | 146.00 | 甲 | 40mg | 门诊/ 病房 | 25℃以下室 温保存 |
| | | 一泰纳 | 20mg×12/盒 | 58.00 | 甲 | 40mg | 门诊 | 密封保存 |
| | | | | | | | | |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 抗焦虑药、镇静催眠药 | | | | | | | | |
| 阿普唑仑片 Δ | Alprazolam | | 0.4mg×20/ 盒 | 2.07 | 甲/精二 | 4mg | 门诊/ 病房 | 避光,密封 保存 |
| 艾司唑仑片 Δ | Estazolam | | 1mg×20/板 | 1.17 | 甲/精二 | 6mg(癫痫 12mg) | 门诊/ 病房 | 遮光,密封 |
| 奥沙西洋片 | Oxazepam | 优菲 | 15mg×20/盒 | 72.20 | 甲/精二 | 120mg | 门诊/ 病房 | 遮光,密封 |
| 地西洋片Δ | Diazepam | | 2.5mg×20/ 板 | 1.47 | 甲/精二 | 40mg | 门诊/ 病房 | 密封保存 |

| 地西洋注射液Δ | | | 10mg:2ml/支 | 0.28 | 甲/精二 | 40-50mg/24h | 门诊/病房 | 遮光密闭 |
|---------|-------------|-----|--------------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|
| 劳拉西洋片Δ | Lorazepam | 罗拉 | 0.5mg×20/盒 | 9.18 | 甲/精二 | 10mg | 门诊/病房 | 25℃以下避光保存 |
| 氯硝西洋片Δ | Clonazepam | | 2mg×20/盒 | 3.43 | 甲/精二 | 20mg | 门诊 | 遮光,密封保存 |
| | | | 2mg×100/瓶 | 15.92 | 甲/精二 | 20mg | 病房 | 遮光,密封保存 |
| 氯硝西洋注射液 | | | 1mg:1ml/支 | 2.30 | 甲/精二 | 20mg | 门诊/病房 | 遮光,密封保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别/ 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 咪哒唑仑片 | Midazolam | 力月西 | 15mg×7/盒 | 17.50 | 甲/精二 | 15mg | 门诊/病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 右佐匹克隆片 | Eszopiclone | 文飞 | 3mg ×6片/盒 | 30.70 | 甲, 限工伤保险/精二 | 3mg | 门诊 | 密封, 干燥处保存 |
| 扎莱普隆胶囊 | Zaleplon | 曲宁 | 5mg×12/盒 | 19.57 | 甲/精二 | 10mg | 门诊 | 遮光, 密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 佐匹克隆片 △ | Zopiclone | 三辰 | 7.5mg×12/ 盒 | 22.98 | 甲/精二 | 7.5mg | 门诊 /病房 | 遮光，密封 保存 |
| 唑吡坦片 | Zolpidem | 思诺思 | 10mg×7/盒 | 23.90 | 甲/精二 | 10mg | 门诊 /病房 | 密闭保存，避 免高温高湿 |
| 丁螺环酮片 | Buspirone | 一舒 | 5mg×60/盒 | 53.82 | 甲 | 40mg | 门诊 /病房 | 遮光，密闭 保存 |
| 氟哌噻吨美 利曲辛片 | Flupenti×ol melitracen | 黛力新 | 20片/盒 | 66.53 | 甲 | 4片 | 门诊 /病房 | 25℃以下 保存 |
| 枸橼酸坦度 螺酮胶囊 | Tandospirone | 律康 | 5mg×48/盒 | 74.90 | 乙 | 60mg | 门诊 | 遮光，密封 |
| 枸橼酸坦度 螺酮片 | | 希德 | 10mg×42/盒 | 140.00 | 乙 | 60mg | 门诊 /病房 | 室温保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |

| 心境稳定剂 | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----|-------------|--------|---|--------|-------|--------------|
| 丙戊酸镁缓释片 | Magnesium Valproate | 神泰 | 0.25g×30/瓶 | 47.30 | 乙 | 2.0g | 门诊/病房 | 密封干燥处保存 |
| 丙戊酸钠缓释片 | Sodium Valproate | 德巴金 | 0.5g×30/瓶 | 76.72 | 甲 | 3.0g | 门诊/病房 | 25℃以下干燥处保存 |
| 卡马西平片Δ | Carbamazepine | 得理多 | 0.2g×30/盒 | 31.06 | 甲 | 2.0g | 门诊/病房 | 遮光, 密封 |
| 拉莫三嗪片 | Lamotrigine | 利必通 | 50mg×30/盒 | 112.00 | 乙 | 500mg | 门诊/病房 | 30℃以下干燥处保存 |
| 碳酸锂片Δ | Lithium | | 0.25g×100/瓶 | 6.90 | 甲 | 2g | 门诊/病房 | 密封保存 |
| 托吡酯片 | Topiramate | 妥泰 | 25mg×60/瓶 | 96.80 | 甲 | 1000mg | 门诊/病房 | 避光, 干燥, 室温密闭 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
|-----------------|-------------|-----|--------------|------------|---------------|--------|-------|------------|
| 中枢兴奋药 | | | | | | | | |
| 哌甲酯缓释片 | Topiramate | 专注达 | 18mg/片 | 21.87 | 甲, 限儿童/精一 | 54mg | 门诊 | 密封保存 |
| | | | 36mg/片 | 37.13 | 甲, 限儿童/精一 | 54mg | 门诊 | 密封保存 |
| 托莫西汀胶囊 | Atomoxetine | 择思达 | 10mg×7/盒 | 134.00 | 乙 | 100mg | 门诊 | 15-30℃室温保存 |
| | | | 25mg×7/盒 | 180.00 | 乙 | 100mg | 门诊/病房 | 15-30℃室温保存 |
| | | | 40mg×7/盒 | 255.00 | 乙 | 100mg | 门诊 | 15-30℃室温保存 |
| 其它神经系统用药 | | | | | | | | |
| 甲钴胺片 | Mecobalamin | 弥可保 | 0.5mg×20/盒 | 35.20 | 甲 | 1.5mg | 门诊/病房 | 避光, 密闭保存 |
| 谷维素片 | Oryzanol | | 10mg×100/瓶 | 4.48 | 甲 | 90mg | 门诊/病房 | 密闭保存 |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
|---------------------|----------------------------|------|----------------|------------|----------------------|--------|-----------|---------------------|
| 脑代谢功能改善、抗痴呆药 | | | | | | | | |
| 吡拉西坦氯化钠注射液 | Piracetam | | 8g:250ml/瓶 | 12.70 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 多奈哌齐片 | Donepezil | 安理申 | 5mg×7/盒 | 161.92 | 乙, 限治疗 中度以上 痴呆 | 10mg | 门诊/ 病房 | 30℃以下 室温环境 保存 |
| 甲磺酸二氢 麦角碱 缓释片 | Dihydroergotoxine Mesylate | 依舒佳林 | 2.5mg×25/ 盒 | 61.29 | 甲 | 5mg | 门诊 | 遮光, 密封 保存 |
| 卡巴拉汀 胶囊 | Rivastigmine | 艾斯能 | 1.5mg×28/ 盒 | 222.00 | 乙, 限治疗 中度以上 痴呆 | 12mg | 门诊/ 病房 | 30℃以下 保存 |
| | | | 3mg×28/盒 | 363.05 | 乙, 限治疗 中度以上 痴呆 | 12mg | 门诊/ 病房 | 30℃以下 保存 |
| | | | 4.5mg×28/ 盒 | 363.05 | 乙, 限治疗 中度以上 | 12mg | 门诊 | 30℃以下 保存 |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 痴呆 医保类别/ 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
|------------|---------------------------------|-----|---------------|------------|---------------------|------------|-------|---------------------|
| 美金刚片 | Memantine | 易倍申 | 10mg × 28片/盒 | 436.00 | 乙, 限重症患者 | 20mg | 门诊/病房 | 密封, 室温 10℃-30℃ 保存 |
| 尼麦角林片 | Nicergoline | 思尔明 | 10mg×30/盒 | 61.61 | 甲 | 60mg | 门诊/病房 | 遮光, 密封保存 |
| 尼莫地平片 △ | Nimodipine | 尼膜同 | 30mg×20/盒 | 32.20 | 甲 | 360mg | 门诊 | 遮光, 密封保存 |
| 三磷酸腺苷二钠注射液 | Adenosine triphosphate disodium | | 20mg:2ml/支 | 0.57 | 甲 | 40mg | 病房 | 凉暗处(避光并不超过 20℃)密闭保存 |
| 银杏叶提取物滴剂 | Extract of Ginkgo biloba leaves | 金纳多 | 1.2g:30ml/瓶 | 66.12 | 乙 | 240mg: 6ml | 门诊/病房 | 室温 10-30℃ 保存 |
| 银杏叶提取物注射液 | | | 17.5mg: 5ml/支 | 28.61 | 乙 | 175mg | 病房 | 常温 10-30℃ 保 |

| | | | | | | | | 存 |
|---------------|-----------------|-----|------------------|------------|---------------|--------|-----------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 抗震颤麻痹药 | | | | | | | | |
| 苯海索片△ | Trihexyphenidyl | | 2mg×100/ 瓶 | 3.89 | 甲 | 20mg | 门诊/ 病房 | 密封保存 |
| 司来吉兰片 | Selegiline | 咪哆吡 | 5mg×100/ 瓶 | 405.99 | 甲 | 10mg | 门诊 | 25℃以下, 紧密封盖 原瓶贮存 |
| 抗胆碱药 | | | | | | | | |
| 阿托品注射液△ | Atropine | | 0.5mg: 1ml/ 支 | 0.23 | 甲 | 2mg/次 | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 东莨菪碱注射液 | Scopolamine | | 0.3mg:1ml/ 支 | 1.30 | 甲 | 1.5mg | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 麻醉用药 | | | | | | | | |
| 丙泊酚 | Propofol | 迪施 | 100mg:10ml/ | 15.52 | 甲 | | 门诊/ | 2-25℃贮存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 注射液 | | 宁 | 支 | | | | 病房 | 不得冷冻 |
| | | 得普利麻 | 200mg:20ml/ 支 | 79.74 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 2-25℃ 贮存 不得冷冻 |
| 氯化琥珀胆碱注射液Δ | Su×amethonium chloride | | 100mg:2ml/ 支 | 3.20 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 抗菌药 | | | | | | | | |
| 阿莫西林 胶囊Δ | Amo×icillin | | 0.25g×24/ 盒 | 13.22 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密闭 |
| 阿奇霉素 胶囊Δ | Azithromycin | 泰力特 | 0.25g×6/盒 | 6.81 | 甲 | | 病房 | 密封, 阴凉 干燥处保 存 |
| 诺氟沙星 胶囊Δ | Norflo×acin | | 0.1g×24/盒 | 3.45 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密闭 |
| 头孢克洛 胶囊 | Cefaclor | 希刻劳 | 0.25g×12/ 盒 | 67.70 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密封, 在干燥凉暗 处不超过 20℃ |
| 头孢羟氨 | Cefadro×il | 欧意 | 0.25×24/盒 | 18.40 | 甲 | | 病房 | 不超过 |

| 苯片 | | | | | | | | 20℃, 密闭 阴凉处保 存 |
|-----------------|-------------------------|---------|------------------|------------|---|------------|-----------|----------------------------------|
| 注射用头孢呋 辛钠粉针Δ | Cefuroxime | 丽扶欣 | 0.75g/支 | 9.20 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密 封, 在阴凉 不超 20℃ 处保存 |
| 左氧氟沙星片Δ | Levofloxacin | 利复 星 | 0.1g×12/盒 | 9.99 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密封 |
| 左氧氟沙星 注射液Δ | | | 0.2g:100ml/ 瓶 | 25.38 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密闭 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 心血管系统用药 | | | | | | | | |
| 阿替洛尔片 Δ | Atenolol | | 12.5mg×60/ 瓶 | 2.24 | 甲 | 200mg | 门诊/ 病房 | 密封保存 |
| 阿托伐他汀 钙片 | Atorvastatin Calcium | 立普 妥 | 10mg×7/盒 | 52.25 | 乙, [适]动 脉粥样硬化 并高脂血 症; 家族性 高胆固醇血 | 80mg | 病房 | 密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | 症 | | | |
| 苯磺酸氨氯地 地平片Δ | Amlodipine | 络活喜 | 5mg×7/盒 | 37.53 | 乙 | 10mg | 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 福辛普利钠 片 | Fosinopril Sodium | 蒙诺 | 10mg×14/ 盒 | 45.93 | 甲 | 40mg | 病房 | 遮光, 密 闭, 低于 20℃以下 保存 |
| 复方利血平 氨苯喋啶片 Δ | Compound Reserpine and Triamterene | 0 号 | 10 片/盒 | 9.38 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 可乐定透皮 贴剂 | Clonidine | | 1.0mg×1 片/ 盒 | 129.95 | 丙[适] Tourette 综合征 | 6.0mg/ 周 | 门诊 药房 | 密封、避 光、30℃以 下 保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 美托洛尔片 Δ | Metoprolol | 倍他 乐克 | 25mg ×20/ 盒 | 7.93 | 甲 | 400mg | 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 硝苯地平 控释片Δ | Nifedipine | 拜新 同 | 30mg×7/盒 | 34.38 | 甲 | 60mg | 病房 | 30℃以下 密封保存 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 硝苯地平片 Δ | | 心痛定 | 10mg×100/ 瓶 | 3.33 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 吲哒帕胺片 Δ | Indapamide | 寿比山 | 2.5mg×30/ 盒 | 16.84 | 甲 | 2.5mg | 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| | | | | | | | | |
| 呼吸系统用药 | | | | | | | | |
| 氨溴索片Δ | Ambroxol | 沐舒坦 | 30mg×20/ 盒 | 25.17 | 甲 | 180mg | 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 消化系统用药 | | | | | | | | |
| 多潘立酮片Δ | Domperidone | 吗丁啉 | 10mg×30/ 盒 | 16.39 | 甲 | 30mg | 病房 | 避光, 密闭 |
| 酚酞片Δ | Phenolphthalein | | 0.1g×100/ 盒 | 3.39 | 甲 | 0.2g | 病房 | 密封保存 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | 瓶 | | | | | |
| 甘草酸二铵 肠溶胶囊 | Diammonium glycyrrhizinate | 天晴 甘平 | 50mg×24/ 盒 | 30.00 | 甲 | 450mg | 门诊/ 病房 | 密封,干燥 处保存 |
| 甘油灌肠剂 | Enema Glycerini | | 110ml/支 | 8.28 | 甲 | | 病房 | 避光,密闭 保存 |
| 开塞露Δ | Enema Glycerine | | 20ml/支 | 0.74 | 甲 | | 病房 | 避光,密封, 在干燥处保 存 |
| 莫沙必利 分散片 | Mosapride | 新络 纳 | 5mg×20/盒 | 26.63 | 甲 | 15mg | 病房 | 密闭保存 |
| 葡醛内酯片 | Glucurrolactone | | 50mg×100/ 瓶 | 5.64 | 甲 | 600mg | 门诊/ 病房 | 遮光,密闭 保存 |
| 葡醛酸钠 注射液 | Sodium Glucuronic Acid | | 0.133g:2ml/ 支 | 0.73 | 甲 | 0.532g | 病房 | 遮光密闭 |
| 乳果糖口服 溶液 | Lactulose | 杜密 克 | 15ml×6 袋/ 盒 | 37.36 | 乙 | 20g: 30ml | 门诊/ 病房 | 避光, 10-25℃保 存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最大 剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------|----------------|-------|---|-------|-------|---------------------|
| 双环醇片 | Bicyclol | 百赛诺 | 25mg×9/盒 | 42.50 | 甲 | 150mg | 门诊/病房 | 密封保存 |
| 小檗碱片Δ | Berberine | | 0.1g×100/瓶 | 9.49 | 甲 | 0.9g | 病房 | 遮光, 密闭 |
| 血液系统用药 | | | | | | | | |
| 阿司匹林肠溶片Δ | Aspirin | 拜阿司匹灵 | 100mg×30/盒 | 14.75 | 甲 | 300mg | 病房 | 密封, 在25℃以下保存 |
| 肝素钠注射液Δ | Heparin sodium | | 1.25 万单位:2ml/支 | 11.68 | 甲 | 4 万单位 | 病房 | 遮光密闭, 存阴凉处 (不超过20℃) |
| 维生素B4片 | Vitamin B4 | | 10mg×100/瓶 | 4.68 | 甲 | 60mg | 门诊/病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 小檗胺片 | Berbamine | | 28mg×48/盒 | 21.26 | 甲 | 336mg | 门诊/病房 | 遮光, 在阴凉不超20℃干燥处保存 |
| 叶酸片Δ | Folic acid | | 5mg×100/瓶 | 2.70 | 甲 | 30mg | 门诊/病房 | 遮光, 密封保存 |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
|---------------|------------|-----|-------------------|------------|---------------|--------|------|------------------------------|
| 降血糖药 | | | | | | | | |
| 阿卡波糖片 △ | Acarbose | 拜唐苹 | 50mg×30/ 盒 | 71.20 | 甲 | 600mg | 病房 | 遮光, 密闭 25℃以下保存 |
| 二甲双胍 肠溶片△ | Metformin | | 0.25g×48/ 瓶 | 22.39 | 甲 | 1.8g | 病房 | 密闭保存 |
| 格列喹酮片 | Gliquidone | 捷适 | 30mg×30/ 盒 | 22.42 | 甲 | 180mg | 病房 | 遮光密闭保 存 |
| 正规胰岛素 △ | Insulin | | 400 单 位:10ml/支 | 20.49 | 甲 | | 病房 | 密闭, 2-10℃保 存, 避免冰 冻 |
| 抗变态反应药 | | | | | | | | |
| 氯雷他定片 △ | Loratadine | 开瑞坦 | 10mg×6/盒 | 21.21 | 乙 | 10mg | 病房 | 遮光, 密闭 保存 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 异丙嗪片Δ | Promethazine | | 25mg×100/ 瓶 | 5.40 | 甲 | 100mg | 门诊/ 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 异丙嗪 注射液Δ | | | 50mg:1ml/支 | 0.46 | 甲 | 100mg | 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| | | | | | | | | |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 解热镇痛药 | | | | | | | | |
| 布洛芬缓释 胶囊Δ | Ibuprofen | 芬必 得 | 0.3g×20/盒 | 14.91 | 甲 | 0.6g | 病房 | 密封 |
| 对乙酰氨基 酚缓释片 | Paracetamol | 泰诺 林 | 0.65g×18/ 盒 | 14.24 | 甲 | 3.9g | 病房 | 遮光, 密闭 |
| 去痛片 | Compound aminopyrine phenacetin | | 0.5g×24/盒 | 2.70 | 甲 | 6片 | 病房 | 密闭干燥 处保存 |
| | | | | | | | | |
| 营养药 | | | | | | | | |

| 肠内营养 混悬液 | Nutrison Fibre | 能全 力 | 500ml/瓶 | 83.07 | 乙，危重 病人较长 时间不能 进食 | | 病房 | 密闭常温 10-30℃，最 多存放 24 小时 |
|-------------------|-------------------|---------|------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 维生素、矿物质类药 | | | | | | | | |
| 赖氨肌醇维 B12 口服溶液 | Vitamin B12 | | 120ml/瓶 | 26.66 | 丙 | 15ml | 门诊 | 遮光，密闭 保存 |
| 葡萄糖酸钙 注射液Δ | Calcium gluconate | | 1.0g:10ml/支 | 0.74 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| 维生素 B12 注射液Δ | Vitamin B12 | | 0.5mg:1ml/ 支 | 0.25 | 甲 | | 病房 | 遮光，密闭 保存 |
| 维生素 B1 片 | Vitamin B1 | | 10mg×100/ 瓶 | 1.57 | 甲 | 30mg | 门诊/ 病房 | 遮光，密封 保存 |
| 维生素 B1 注射液Δ | | | 0.1g:2ml/支 | 0.24 | 甲 | 300mg | 病房 | 遮光，密闭 保存 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 维生素 B2 片Δ | Vitamin B2 | | 5mg×100/ 瓶 | 1.15 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 维生素 B6 片Δ | Vitamin B6 | | 10mg×100/ 瓶 | 2.30 | 甲 | 20mg | 门诊/ 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 维生素 B6 注射液Δ | | | 50mg:1ml/支 | 0.18 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 维生素 C 片 | Vitamin C | | 0.1g×60/盒 | 3.99 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密封 保存 |
| 维生素 C 注射液Δ | | | 1g:2.5ml/支 | 0.57 | 甲 | | 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 调节水、电解质及酸碱平衡药 | | | | | | | | |
| 复方氯化钠 注射液Δ | Compound sodium chloride | | 500ml/袋 | 5.95 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| 氯化钾 缓释片Δ | Potassium chloride | | 0.5×24/盒 | 5.52 | 甲 | 6g | 病房 | 密封在干 燥处保存 |
| 氯化钾 | | | 1.5g:10ml/支 | 0.49 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 注射液Δ | | | | | | | | |
| 氯化钠注射液 | Sodium chloride | | 0.9% 10ml/ 支 | 1.59 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| | | | 0.9% 100ml/袋 | 5.75 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| | | | 0.9% 250ml/袋 | 6.55 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| | | | 0.9% 500ml/袋 | 6.90 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 葡萄糖氯化钠注射液Δ | Glucose and sodium chloride | | 500ml/袋 | 7.24 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| 葡萄糖注射液Δ | Glucose | | 5% 500ml/袋 | 7.13 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| | | | 10% 500ml/袋 | 7.68 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| | | | 25% 20ml/支 | 0.57 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| | | | 50% 20ml/支 | 1.62 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| 中成药 | | | | | | | | |
| 巴戟天寡糖胶囊 | | | 0.3g×20粒/ 盒 | 208.00 | 丙 | 0.6g | 门诊 | 密封保存 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 板蓝根颗粒 △ | | | 5g × 10 袋/ 盒 | 8.62 | 甲 | 40g | 病房 | 密封保存 |
| 通便胶囊 | | | 0.35g × 27 粒/盒 | 35.78 | 甲 | 2.1g | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 川贝枇杷 糖浆 | | | 150ml/瓶 | 8.22 | 甲 | 30ml | 病房 | 密封, 阴凉 处保存 |
| 复方丹参片 △ | | | 0.32g × 60/ 瓶 | 8.28 | 甲 | 2.88g | 病房 | 密封保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 感冒清热颗 粒(无蔗糖) △ | | | 6g × 10 袋/ 盒 | 12.65 | 甲 | 12g | 病房 | 密封保存 |
| 藿香正气软 胶囊△ | | | 450mg × 30 粒/盒 | 13.43 | 甲 | 3.6g | 病房 | 密封保存 |
| 急支糖浆△ | | | 200ml/瓶 | 11.05 | 甲 | 120ml | 病房 | 密封保存 |
| 加味逍遥丸 | | | 6g × 10 袋/ 盒 | 9.07 | 甲 | 12g | 门诊/ 病房 | 密闭, 防潮 保存 |
| 静灵口服液 | | | 10ml × 10 | 73.19 | 甲 | 30ml | 门诊 | 密闭, 置阴 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 支/盒 | | | | | 凉处保存 |
| 九味镇心 颗粒 | | | 6g × 10 袋/ 盒 | 70.38 | 乙 | 18g | 门诊/ 病房 | 密封保存 |
| 麻仁软胶囊 Δ | | | 0.6g × 20 粒 /盒 | 14.16 | 甲 | 3.6g | 门诊/ 病房 | 密封保存 |
| 牛黄解毒片 Δ | | | 30 片/盒 | 2.84 | 甲 | 9 片 | 病房 | 密封保存 |
| 牛黄清心丸 | | | 3g × 6 丸/盒 | 26.17 | 甲 | 12g | 病房 | 密封保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 牛黄上清丸 Δ | | | 6g × 10 丸/ 盒 | 9.36 | 甲 | 12g | 病房 | 密封保存 |
| 肉蔻五味丸 | | | 0.2g × 60 粒 /盒 | 24.11 | 乙 | 9g | 门诊 | 防潮, 密闭 保存 |
| 麝香壮骨膏 | | | 10 贴/盒 | 14.39 | 甲 | | 病房 | 密闭保存 |
| 舒肝解郁 胶囊 | | | 0.36g × 28 粒/盒 | 65.14 | 乙 | 1.44g | 门诊 | 密闭保存 |
| 舒眠胶囊 | | | 0.4g × 36 粒/ 盒 | 44.50 | 甲 | 2.4g | 门诊 | 密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | | | 盒 | | | | | |
| 双黄连 口服液△ | | | 10 ml × 10 支/盒 | 8.45 | 甲 | 60ml | 病房 | 密封, 避光 保存 |
| 四磨汤 口服液 | | | 10ml × 10 支/盒 | 23.13 | 甲 | 60ml | 门诊/ 病房 | 密封, 阴凉 不超 20℃ 保存 |
| 乌鸡白凤丸 △ | | | 9g × 10 丸/ 盒 | 12.82 | 甲 | 18g | 门诊/ 病房 | 密封保存 |
| 乌灵胶囊 | | | 0.33g × 36 粒/盒 | 47.24 | 甲, 限门诊 使用 | 2.97g | 门诊 | 密闭保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 小儿智力 糖浆 | | | 10ml × 10 支/盒 | 38.37 | 甲 | 45ml | 门诊 | 密封, 置阴 凉处保存 |
| 心可舒片△ | | | 0.31g × 48/ 盒 | 20.90 | 甲 | 3.72g | 门诊 | 密封保存 |
| 心神宁片 | | | 0.25g × 80/ 瓶 | 36.45 | 甲 | 4.5g | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 益脑胶囊 | | | 0.3g × 60 粒/ | 35.65 | 甲, 限门诊 | 2.7g | 门诊 | 密封保存 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 盒 | | 使用 | | | |
| 益心巴迪然 吉布亚颗粒 | | | 12g×6 袋/盒 | 37.23 | 甲 | 18g | 门诊 | 密封保存 |
| 银杏叶胶囊 Δ | | 百路 达 | 9.6mg ×20 粒/盒 | 24.52 | 甲 | 57.6mg | 门诊 | 密闭保存 |
| 急救药品 | | | | | | | | |
| 0.9%氯化 钠Δ | Sodium chloride | | 100ml/袋 | 5.75 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| | | | 250ml/袋 | 6.55 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| | | | 500ml/袋 | 6.90 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 10%葡萄糖 Δ | Glucose | | 500ml/袋 | 7.68 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 25%葡萄糖 Δ | | | 20ml/支 | 0.57 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 5%葡萄糖 | | | 500ml/袋 | 7.13 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Δ | | | | | | | 病房 | |
| 50%葡萄糖 Δ | | | 20ml/支 | 1.62 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 阿托品 注射液Δ | Atropine | | 0.5mg:1ml/ 支 | 0.34 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 氨茶碱 注射液Δ | Aminophylline | | 0.25g:10ml/ 支 | 0.40 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 胺碘酮 注射液 | Amiodarone | | 0.15g:3ml/支 | 29.71 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 25℃以下 避光保存 |
| 地塞米松 注射液Δ | DeX amethasone | | 5mg:1ml/支 | 0.40 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 多巴胺 注射液Δ | Dopamine | | 20mg:2ml/支 | 0.57 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 呋塞米 注射液Δ | Furosemide | | 20mg:2ml/支 | 0.52 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 复方氯化钠 Δ | Compound sodium chloride | | 500ml/袋 | 5.95 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 甘露醇注射液Δ | Mannitol | | 20% 250ml/瓶 | 3.10 | 甲 | | 门诊/病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 间羟胺注射液Δ | Metaraminol | | 10mg:1ml/支 | 5.19 | 甲 | | 门诊/病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 利多卡因注射液Δ | Lidocaine | | 2% 5ml/支 | 0.47 | 甲 | | 门诊/病房 | 密闭保存 |
| 洛贝林注射液Δ | Lobeline | | 3mg:1ml/支 | 1.55 | 甲 | | 门诊/病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 咪达唑仑注射液Δ | Midazolam | | 10mg:2ml/支 | 23.66 | 甲 | | 门诊/病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 尼可刹米注射液Δ | Nikethamide | | 0.375mg:1.5ml/支 | 0.78 | 甲 | | 门诊/病房 | 遮光, 密闭保存 |
| 葡萄糖氯化钠Δ | Glucose and sodium chloride | | 500ml/袋 | 7.24 | 甲 | | 门诊/病房 | 密闭保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格(最小包装) | 参考价(元) | 医保类别/精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 葡萄糖酸钙注射液Δ | Calcium gluconate | | 1g:10ml/支 | 0.74 | 甲 | | 门诊/病房 | 密闭保存 |
| 去氧肾上腺 | Phenylephrine | | 10mg:1ml/支 | 3.68 | 甲 | | 门诊/ | 遮光, 密闭 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 素注射液 | | | | | | | 病房 | 保存 |
| 去乙酰毛花甙注射液Δ | Deslanoside | | 0.4mg:2ml/ 支 | 3.59 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 肾上腺素注射液Δ | Epinephrine | | 1mg:1ml/支 | 2.10 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭, 不超过 20℃保存 |
| 碳酸氢钠注射液Δ | Sodium Bicarbonate | | 0.5g:10ml/支 | 0.46 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 乌拉地尔注射液 | Urapidil | 亚宁 定 | 25mg:5ml/支 | 58.30 | 乙 | | 门诊/ 病房 | 25℃以下 保存 |
| 消旋山莨菪碱注射液 | Raceanisodamine | | 10mg:1ml/支 | 0.69 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 密闭保存 |
| 硝酸甘油注射液Δ | Glyceryl Trinitrate | | 5mg:1ml/支 | 1.42 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭, 不超过 20℃保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 分级 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 异丙肾上腺素注射液Δ | Isoprenaline | | 1mg:2ml/支 | 3.49 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 遮光, 密闭, 不超过 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | 20℃保存 |
| 右旋糖酐 40 葡萄糖 注射液Δ | De×tran 40 Glucose | | 500ml/瓶 | 5.46 | 甲 | | 门诊/ 病房 | 25℃以下 保存 |
| 高危药品 | | | | | | | | |
| 25% 葡萄糖 Δ | Glucose | | 20ml/支 | 0.57 | | A | 病房 药房 | 密闭保存 |
| 50% 葡萄糖 Δ | | | 20ml/支 | 1.62 | | A | 病房 药房 | 密闭保存 |
| 阿卡波糖片 Δ | Acarbose | 拜唐 苹 | 50mg×30/ 盒 | 71.20 | | C | 病房 药房 | 遮光, 密闭 25℃以下 保存 |
| 丙泊酚 注射液Δ | Propofol | 得普 利麻 | 200mg:20ml/ 支 | 79.74 | | A | MECT 室 | 2-25℃贮存 不得冷冻 |
| | | 迪施 宁 | 100mg:10ml/ 支 | 15.52 | | A | MECT 室 | 2-25℃贮存 不得冷冻 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 分级 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 多巴胺 | Dopamine | | 20mg:2ml/支 | 0.57 | | A | 抢救 | 遮光, 密闭 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----|--------------------|-------|--|---|---------------|-------------------------------|
| 注射液Δ | | | | | | | 车用 药 | 保存 |
| 二甲双胍 肠溶片Δ | Metformin | | 0.25g×48/ 瓶 | 22.39 | | C | 病房 药房 | 密闭保存 |
| 肝素钠 注射液Δ | Heparin sodium | | 1.25 万单 位:2ml/支 | 11.68 | | B | 病房 药房 | 遮光密闭, 存阴凉处 (不超过 20℃) |
| 格列喹酮片 | Gliquidone | 捷适 | 30mg×30/ 盒 | 22.42 | | C | 病房 药房 | 遮光密闭 保存 |
| 间羟胺 注射液Δ | Metaraminol | | 10mg:1ml/支 | 5.19 | | A | 抢救 车用 药 | 遮光, 密闭 保存 |
| 利多卡因 注射液Δ | Lidocaine | | 2% 5ml/支 | 0.47 | | A | 抢救 车用 药 | 密闭保存 |
| 氯化琥珀胆 碱注射液Δ | Su xamethonium chloride | | 100mg:2ml/ 支 | 3.20 | | C | MECT 室 | 密闭保存 |
| 氯化钾 注射液Δ | Potassium chloride | | 1.5g:10ml/支 | 0.49 | | A | 病房 药房 | 密闭保存 |

| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药品 | 分级 | 使用部门 | 贮存条件 |
|---------------|-----------------------|-----|--------------|------------|---------------|----|-------|------------------|
| 咪达唑仑注射液Δ | Midazolam | | 10mg:2ml/支 | 23.66 | | A | 抢救车用药 | 遮光, 密闭保存 |
| 去乙酰毛花甙注射液Δ | Deslanoside | | 0.4mg:2ml/支 | 3.59 | | A | 抢救车用药 | 遮光, 密闭保存 |
| 肾上腺素注射液Δ | Epinephrine | | 1mg:1ml/支 | 2.10 | | A | 抢救车用药 | 遮光, 密闭, 不超过20℃保存 |
| 异丙嗪注射液Δ | Promethazine | | 50mg:1ml/支 | 0.46 | | B | 病房药房 | 遮光, 密封保存 |
| 异丙肾上腺素注射液Δ | Isoprenaline | | 1mg:2ml/支 | 3.49 | | A | 抢救车用药 | 遮光, 密闭, 不超过20℃保存 |
| 右旋糖酐40葡萄糖注射液Δ | Dextran 40 Glucose | | 500ml/瓶 | 5.46 | | A | 抢救车用药 | 25℃以下保存 |

| 正规胰岛素 Δ | Insulin | | 400 单 位:10ml/支 | 20.49 | | A | 病房 药房 | 密闭, 2-10℃保 存, 避免冰 冻 |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|----------|------------------------------|
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 职工药品 | | | | | | | | |
| 阿卡波糖片 Δ | Acarbose | 拜唐 苹 | 50mg×30/ 盒 | 71.20 | 甲 | 600mg | 病房 药房 | 遮光, 密闭 25℃以下 保存 |
| 阿奇霉素 胶囊Δ | Azithromycin | 泰力 特 | 0.25g×6/盒 | 6.81 | 甲 | | 病房 药房 | 密封, 阴凉 干燥处保 存 |
| 阿司匹林 肠溶片Δ | Aspirin | 拜阿 司匹 灵片 | 100mg×30/ 盒 | 14.75 | 甲 | 300mg | 病房 药房 | 密封, 在 25℃以下 保存 |
| 阿托伐他 汀钙片 | Atorvastatin Calcium | 立普 妥 | 10mg×7/盒 | 52.25 | 乙, [适]动 脉粥样硬 化并高脂 | 80mg | 病房 药房 | 密闭保存 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 血症;家族性高胆固醇血症 | | | |
| 氨溴索片Δ | Ambro×ol | 沐舒坦 | 30mg×20/盒 | 25.17 | 甲 | 180mg | 病房药房 | 遮光, 密闭保存 |
| 苯磺酸氨氯地平片Δ | Amlodipine | 络活喜 | 5mg×7/盒 | 37.53 | 乙 | 10mg | 病房药房 | 遮光, 密闭保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格(最小包装) | 参考价(元) | 医保类别/精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 布洛芬缓释胶囊Δ | Ibuprofen | 芬必得 | 0.3g×20/盒 | 14.91 | 甲 | | 病房药房 | 密封 |
| 对乙酰氨基酚缓释片 | Paracetamol | 泰诺林 | 0.65g×18/盒 | 14.24 | 甲 | | 病房药房 | 遮光, 密闭 |
| 多潘立酮片Δ | Domperidone | 吗丁啉 | 10mg×30/盒 | 16.39 | 甲 | 30mg | 病房药房 | 避光, 密闭 |
| 二甲双胍肠溶Δ | Metformin | | 0.25g×48/瓶 | 22.39 | 甲 | 1.8g | 病房药房 | 密闭保存 |
| 酚麻美敏片 | Paracetamol,Pseudoephedrine Hydrochloride,De | 泰诺 | 10片/盒 | 10.21 | 甲 | 8片 | 病房药房 | 密闭干燥处保存 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | ×tromethorphan Hydrobromide and Chlorphenamine Maleate | | | | | | | |
| 酚酞片Δ | Phenolphthalein | | 0.1g×100/ 瓶 | 3.39 | 甲 | 200mg | 病房 药房 | 密封保存 |
| 复方利血平 氨苯喋啶片 Δ | Compound Reserpine and Triamterene | 0 号 | 10 片/盒 | 9.38 | 甲 | 1 片 | 病房 药房 | 遮光, 密封 保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 格列喹酮片 | Gliquidone | 捷适 | 30mg×30/ 盒 | 22.42 | 甲 | 180mg | 病房 药房 | 遮光密闭 保存 |
| 氯雷他定片 Δ | Loratadine | 开瑞 坦 | 10mg×6/盒 | 21.21 | 乙 | | 病房 药房 | 遮光, 密闭 保存 |
| 美托洛尔片 Δ | Metoprolol | 倍他 乐克 | 25mg ×20/ 盒 | 7.93 | 甲 | 400mg | 病房 药房 | 避光, 密封 保存 |
| 诺氟沙星 胶囊Δ | Norflo×acin | | 0.1g×24/盒 | 3.45 | 甲 | | 病房 药房 | 遮光, 密闭 |
| 去痛片 | Compound | | 0.5g×24/盒 | 2.70 | 甲 | 6 片 | 病房 | 密闭干燥 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | aminopyrine phenacetin | | | | | | 药房 | 处保存 |
| 头孢克洛胶囊 | Cefaclor | 希刻劳 | 0.25g×12/盒 | 67.70 | 甲 | | 病房药房 | 遮光, 密封, 在干燥阴凉处不超过 20℃ |
| 头孢羟氨苄片 | Cefadro×il | 欧意 | 0.25g×24/盒 | 18.14 | 甲 | | 病房药房 | 不超过 20℃, 密闭阴凉处保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品名 | 规格 (最小包装) | 参考价 (元) | 医保类别 / 精神药品 | 每日最大剂量 | 使用部门 | 贮存条件 |
| 维生素 C 注射液Δ | Vitamin C | | 1g:2.5ml/支 | 0.57 | 甲 | | 病房药房 | 遮光, 密闭保存 |
| 硝苯地平控释片Δ | Nifedipine | 拜新同 | 30mg×6/盒 | 34.38 | 甲 | 60mg | 病房药房 | 30℃以下密封保存 |
| 小檗碱片Δ | Berberine | | 0.1g×24/袋 | 2.40 | 甲 | 0.9g | 病房药房 | 遮光, 密闭 |
| 银杏叶提取 | E×tract of | 金纳 | 17.5mg; 5ml/ | 28.61 | 乙 | 175mg | 病房 | 常温 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 物注射液 | Ginkgo biloba leaves | 多注射液 | 支 | | | | 药房 | 10-30℃保存 |
| 吡啶帕胺片 Δ | Indapamide | 寿比山 | 2.5mg×30/ 盒 | 16.84 | 甲 | 2.5mg | 病房 药房 | 遮光, 密封 保存 |
| 左氧氟 沙星片Δ | Levoflo×acin | 利复 星 | 0.1g×12/盒 | 9.09 | 甲 | | 病房 药房 | 遮光, 密封 |
| 板蓝根颗粒 Δ | | | 5g×10袋/盒 | 8.62 | 甲 | 40g | 病房 药房 | 密封保存 |
| 川贝枇杷 糖浆 | | | 150ml/瓶 | 8.22 | 甲 | 30ml | 病房 药房 | 密封, 阴凉 处保存 |
| 复方丹参片 Δ | | | 0.32g×60/ 瓶 | 8.28 | 甲 | 2.88g | 病房 药房 | 密封保存 |
| 中文通用名 | 英文通用名 | 商品 名 | 规格 (最小包 装) | 参考价 (元) | 医保类别 /精神药 品 | 每日最 大剂量 | 使用 部门 | 贮存 条件 |
| 感冒清热颗 粒(无糖)Δ | | | 6g ×10袋/ 盒 | 12.65 | 甲 | 12g | 病房 药房 | 密封保存 |
| 藿香正气 软胶囊Δ | | | 450mg ×30 粒/盒 | 13.43 | 甲 | 3.6g | 病房 药房 | 密封保存 |
| 急支糖浆Δ | | | 200ml/瓶 | 11.05 | 甲 | 120ml | 病房 | 密封保存 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------|-------|---|------|----------|--------------|
| | | | | | | | 药房 | |
| 牛黄解毒片 | | | 30/盒 | 2.84 | 甲 | 9片 | 病房 药房 | 密封保存 |
| 牛黄清 心丸 Δ | | | 3g \times 6丸/盒 | 26.17 | 甲 | 12g | 病房 药房 | 密封保存 |
| 牛黄上清丸 | | | 6g \times 10丸/ 盒 | 9.36 | 甲 | 12g | 病房 药房 | 密封保存 |
| 麝香壮骨膏 | | | 10贴/盒 | 14.39 | 甲 | | 病房 药房 | 密闭保存 |
| 双黄连 口服液 Δ | | | 10ml \times 10支 /盒 | 8.45 | 甲 | 60ml | 病房 药房 | 密封, 避光 保存 |

注：职工如需使用门诊药房药品，请凭收费处方至门诊药房取药。

版权归北京大学第六医院药剂科所有！